

Figur 117. De mest almindelige seksygdomme.

SYGDOM	Årsag	Antal nye tilfælde pr. år (2004)	Symptomer optræder efter	Kan medføre	Behandling
Klamydia	Bakterie	22.000 især 15–30-årige Ca.10% er smittet	Normalt 2–3 uger	Underlivsbetændelse, ufrivillig barnløshed, graviditet udenfor livmoderen	Antibiotika
Kønsvorter	Virus	10–15% af de 20–30-årige er smittet, færre ældre	Fra få dage til år	Livmoderhalskræft, gælder kun nogle typer af virus	Cremer eller fjernelse under lokalbedøvelse, fjerner ikke virus
Herpes genitalis	Virus	Ca. 25% har antistof mod herpes g., dvs. de er smittet	Fra få dage til år	Udbrud ca. 4 gange årligt dog oftere ved stress. Udbruddene der ca. varer 2–12 dage, bliver ofte mildere og kan til sidst forsvinde. Livmoderhalskræft	Kun piller der kan dæmpe virus så udbruddene bliver mindre og sjældnere
Hiv	Virus	300	3 mdr.	Aids	Kun medicin der kan dæmpe hiv-virus så udbrud af aids forsinkes
Gonorré	Bakterie	Ca. 450	2–7 dage	Underlivsbetændelse, ufrivillig barnløshed	Antibiotika
Hepatitis B	Virus	Under 50	1–3 mdr., dog uden symptomer hos nogle	Leverbetændelse i 4–6 uger. Kan blive kronisk og medføre skrumpelever og kræft	Ingen, kan forebygges med vaccination
Syfilis	Bakterie	Ca. 150	Ca. 3 uger	Betændelse i hjerne, nerver og hovedpulsåre	Antibiotika
Mycoplasma	Bakterie	Ukendt	Ukendt	Underlivsbetændelse, ufrivillig barnløshed	Antibiotika
Trichomonas	Parasit	Under 100			Piller
Fnat	Mide		2–6 uger		Shampoo, creme
Fladlus	Insekt				Shampoo, creme
Candida	Gærsvamp				Cremer, piller, stikpiller